О негативном влиянии искусственного аборта на организм женщины, высокая вероятность бесплодия и осложнения искусственного прерывания беременности

Искусственный аборт (медицинский аборт) – искусственное прерывание беременности до 21,6 недель включительно.

Искусственный аборт (медицинский аборт) проводится по:

- медицинским показаниям со стороны матери (когда пролонгирование беременности ассоциировано с высоким риском материнской смерти) или со стороны плода (при некорректируемых заболеваниях плода, несовместимых с жизнью и/или с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья) (независимо от срока беременности),
- социальным показаниям (до 21,6 недель беременности включительно),
- по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования в кабинете медико-социальной помощи женской консультации или в центре медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (до 11,6 недель беременности включительно).

Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 №736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности». Социальные показания для искусственного аборта определяются Правительством Российской Федерации Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020).

Любой аборт, как серьезное медицинское вмешательство, неизбежно несет за собой риск осложнений, которые могут повлечь за собой отдаленные риски невынашивания беременности и бесплодия.

Негативные последствия и осложнения после аборта могут быть следующими:

- маточные кровотечения
- неполный аборт (остатки плодного яйца в полости матки);
- инфекционные осложнения;
- прогрессирование беременности в ситуации, когда не произошло отторжение плодного яйца;
- перфорация матки;
- аллергическая реакция на препараты;
- травмы шейки матки;
- гематометра;
-плацентарный полип;
- постабортная депрессия.